

Activités d'approche et révisions

Exercice TRIGO 1. Exercices de la classe virtuelle WIMS pour vérifier que tout le monde sait s'y connecter.

Exercice TRIGO 2. Exprimer la forme algébrique du nombre complexe $z=(\cos x+ i \sin x)^2$ en fonction de $\cos(2x)$ et $\sin(2x)$.

Exercice TRIGO 3. Résoudre dans \mathbb{R} l'équation $2\sqrt{3}\sin(2x)-3=0$ et représenter les solutions sur le cercle trigonométrique.

Exercice TRIGO 4.

[Idée : , feuille « Maths à valin ».]

1) Au moyen du cercle trigonométrique, donner le tableau de variation des fonctions de sinus et cosinus sur $[0, \pi]$.

2) Dans cette question on va tracer les courbes représentatives de sinus et cosinus à l'aide du cercle trigonométrique :

a) A gauche de votre feuille, tracer un cercle trigonométrique et y placer les réels $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}$ et π . En parallèle, compléter le tableau des valeurs remarquables (à connaître!).

t	0	$\frac{\pi}{6}=30^\circ$	$\frac{\pi}{4}=45^\circ$	$\frac{\pi}{3}=60^\circ$	$\frac{\pi}{2}=90^\circ$
$\cos t$					
$\sin t$					

b) Tracer les axes d'un repère orthonormé tel que le centre de votre cercle trigonométrique ait pour coordonnées $(-1, 0)$

c) Tracer la courbe représentative de sinus sur $[0, \pi]$. On commencera par tracer en pointillés les droites d'équation $y=1, y=\frac{1}{2}, y=\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $y=\frac{\sqrt{3}}{2}$ au moyen du cercle trigonométrique.

d) Tracer la courbe représentative de cosinus sur $[0, \pi]$.

3) Vérifier que les courbes représentatives de sinus et cosinus sont cohérentes avec le tableau de variation des fonctions de sinus et cosinus sur $[0, \pi]$ obtenues en 1) à l'aide du cercle trigonométrique.

Exercice TRIGO 5.

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x)=\cos(2x)-7\cos x-3$

1) Exprimer f en fonction de $\cos x$ seulement.

2) Donnez une expression factorisée de $f(x)$.

3) Déterminer l'abscisse des points d'intersection de \mathcal{C}_f avec l'axe des abscisses.

Exercice TRIGO 6.

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x)=4\sin^4(x)-3\cos x$. Oumou doit calculer la valeur exacte de certaines intégrales pour le prochain cours de maths. Heureusement, sa grande sœur qui a fait une prépa est de passage à Dakar et elle lui dit que $A=\int_0^{\pi/2} f(x)dx=\frac{3\pi}{4}-3$ et « à partir de là, débrouille-toi pour en déduire les autres, je dois y aller, mes copains m'attendent ». Les autres intégrales à calculer sont B=

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x)dx \text{ et } C=\int_{8\pi}^{\frac{15\pi}{2}} f(x)dx .$$

1) Tracez \mathcal{C}_f à la calculatrice, observez des propriétés qui peuvent permettre de calculer B et C (je sais, c'est vague, c'est fait exprès) puis prouvez vos conjectures.

2) Déterminez la valeur exacte des intégrales B et C.

Avec le cours de TS


□ Exercice TRIGO 7. Le paravent

[source : site de G Costantini.]

Échauffement. Résoudre l'inéquation : $-2X^2 - X + 1 \geq 0$


Problème : le paravent.

Un paravent est constitué de trois panneaux verticaux P_1 , P_2 et P_3 (de formes rectangulaires) articulés en B et C .



On suppose que les panneaux ont une largeur de 1 m ($AB=BC=CD=1$) et que l'angle d'ouverture de P_1 et P_3 est le même. Le but du problème est de rechercher l'ouverture qu'il faut donner aux panneaux pour que la stabilité du paravent soit maximale. On admet (propriété physique) que la stabilité du paravent est maximale lorsque l'aire du "polygone de sustentation" (dans notre cas, il s'agit du trapèze isocèle $ABCD$) est maximale.

Représentation du polygone de sustentation en vue de dessus :



On note H et K les projetés respectifs de B et C sur $[AD]$ et x l'angle $\widehat{ABH} = \widehat{KCD}$.

On suppose que $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

1- Calculer l'aire $S(x)$ du trapèze $ABCD$.

2- Calculer la dérivée S' de la fonction S puis démontrer que $S'(x) = -2\sin^2 x - \sin x + 1$.

3- Etudier le signe de S' pour $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. (on pourra poser $X = \sin x$ et utiliser l'exercice

d'échauffement)

4- Dresser le tableau de variations de la fonction S sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

5- Tracer la représentation graphique de la fonction S .

6- Pour quel angle x la stabilité du paravent est-elle maximale ?

Exercice TRIGO 8. Calculer $a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{3x}$; $b = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$; $c = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$; $d = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^2}$; $e = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x}$; $f = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2}$; $g = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{5x}$; $h = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{6x^2}$; $i = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{\sin(x)}$

Exercice TRIGO 9. La fonction tangente est définie par $\tan(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$.

- 1) Étudier la parité et la périodicité de f . En déduire que l'on peut réduire le domaine d'étude.
- 2) Montrer que la fonction *tangente* a pour dérivée $\tan'(x) = 1 + \tan^2 x$ sur son domaine de définition.
- 3) Dresser le tableau de variation complet de la fonction *tangente* sur $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$.

Exercice TRIGO 10.

Soit C la courbe représentative de la fonction sinus et soit T sa tangente en 0.

- 1) Montrer que $\forall x \geq 0$, T est toujours en dessous de C.
- 2) Sans faire aucun calcul, déterminer les positions relatives de C et T pour $x \in]-\infty, 0]$.

Exercice TRIGO 11.

On considère la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = |\cos x| + \cos x$.

- 1) Étudier la parité de la fonction f .
- 2) Étudier la périodicité de la fonction f .
- 3) Tracer la représentation graphique de f sur l'intervalle $[-2\pi; 2\pi]$.

Exercice TRIGO 12.

On considère la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \cos(2x) - 2\cos x$.

- 1) Étudier la parité de la fonction f .
- 2) Étudier la périodicité de la fonction f .
- 3) Dresser le tableau de variations de f sur l'intervalle $[0; \pi]$.
- 4) Dresser le tableau de variations de f sur l'intervalle $[0; \pi]$.
- 5) Tracer la représentation graphique de f sur l'intervalle $[-2\pi; 2\pi]$.

Exercice TRIGO 13. k étant un nombre réel, on considère la fonction définie sur \mathbb{R} par

$$\begin{cases} f(x) = \frac{4x + \sin(2x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = k \end{cases}$$

- 1) Montrer qu'il existe une valeur de k pour laquelle f est continue en 0. On supposera que k est égal à cette valeur dans tout ce qui suit.
- 2) Déterminer toutes les asymptotes de la représentation graphique f .

Exercice TRIGO 14. *Correction disponible*

On considère la fonction f définie par $f(x) = 3 \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$.

- 1) Donner le domaine de définition de f .
- 2) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $-3 \leq f(x) \leq 3$. Que peut-on en déduire sur la courbe représentative de f ?
- 3) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x + \pi) = f(x)$. En déduire que f est périodique et préciser sa période. Que peut-on en déduire sur sa courbe représentative?
- 4) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -6 \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$.
- 5) Montrer que si $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$, alors $2x + \frac{\pi}{2} \in [0; \pi]$. En déduire le signe de f' sur $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$. Étudier de même le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$.
- 6) Dresser le tableau de variations de f sur $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$.
- 7) Donner l'équation de la tangente en f au point d'abscisse $\frac{\pi}{4}$.
- 8) Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé ainsi que sa tangente en $\frac{\pi}{4}$.

Exercice TRIGO 15. Démontrer que l'équation $\cos(4x + 2) - 8x = -1$ admet une unique solution dans \mathbb{R} et en donner un encadrement à 10^{-1} près au moyen de la calculatrice.

□ Exercice TRIGO 16.

On définit une fonction f sur \mathbb{R} par $f(x) = 1 + \sin(2x) + 2 \cos(x)$

- 1) Précisez la période de f
- 2) Montrer que le point de la courbe de f d'abscisse $\frac{\pi}{2}$ en est centre de symétrie.

Sur quel intervalle allez-vous étudier f ?

- 3) Calculer f' , et prouver que pour tout réel x , $f'(x) = -2(2 \sin x - 1)(1 + \sin x)$

En déduire les variations de f .

- 4) Tracer la courbe de f dans un repère dont l'unité est laissée à votre sagesse.

- 5) Donner le sens de variation de la fonction g définie sur $[\frac{-\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ par

$$g(x) = 2x - \cos(2x) + 4 \sin(x) \text{ (on justifiera avec soin).}$$

□ Exercice TRIGO 17. On veut étudier l'existence et le nombre d'extremum de la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^2 - 2 \sin x$. Pour cela on étudie d'abord la fonction f' dérivée de f sur \mathbb{R} .

- 1) Étude de f' :

a) Vérifier que $f'(x) = 2(x - \cos x)$ et étudier les variations de f' sur \mathbb{R} .

b) Préciser les limites de f' en $+\infty$ et $-\infty$.

- 2) Montrer que l'équation $f'(x) = 0$ admet une et une seule solution dans \mathbb{R} , notée α . Déterminer une valeur approchée de α à 10^{-1} près.

- 3) Donner le signe de f' sur \mathbb{R} . En déduire le tableau de variations de f et justifier l'existence d'un seul minimum m pour f .

- 4) Montrer que m vérifie $m = \alpha^2 - 2\sqrt{1 - \alpha^2}$.

Fait en AP

Savoir-faire 1. Comment vérifier l'expression d'une dérivée avec un logiciel de calcul formel ?

Avec Geogebra 4, pour obtenir l'expression de la dérivée de $f(x)=\cos(7x)$, tapez dans la ligne de saisie $f(x)=\cos(7x)$ puis tapez dans la ligne de saisie $f'(x)=\text{Dérivée}[f]$ (Avec le D majuscule et l'accent sur le é) et vous aurez l'expression de la dérivée dans la colonne de gauche (colonne « algèbre »)

Exercice TRIGO 18. Complétez le tableau suivant. Vous vérifierez l'expression trouvée pour la dérivée avec Geogebra (voir savoir-faire ci-dessous)

Fonction	1) $f(x)=\cos(3x)$	2) $g(x)=\cos\left(\frac{3}{x}\right)$	3) $h(x)=\sin^2 x$
Domaine de définition			
Dérivée			
Dérivée cohérente avec logiciel de calcul formel ?			
Périodique ? Si oui, meilleure période ?			


Exercice TRIGO 19. Lapin et camion [Baccalauréat Nouvelle Calédonie 2005, Exercice 4, 5 pts]

Un lapin désire traverser une route de 4 mètres de largeur. Un camion, occupant toute la route, arrive à sa rencontre à la vitesse de 60 km/h. Le lapin décide au dernier moment de traverser, alors que le camion n'est plus qu'à 7 mètres de lui. Son démarrage est foudroyant et on suppose qu'il effectue la traversée en ligne droite au maximum de ses possibilités, c'est à dire à . . . 30 km/h !

L'avant du camion est représenté par le segment $[CC']$ sur le schéma ci-dessous.

Le lapin part du point A en direction de D.

Cette direction est repérée par l'angle $\theta = \widehat{BAD}$ avec $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ (en radians).



1) Déterminer les distances AD et CD en fonction de θ et les temps t_1 et t_2 mis par le lapin et le camion pour parcourir respectivement les distances AD et CD .

2) On pose $f(\theta) = \frac{7}{2} + 2 \tan \theta - \frac{4}{\cos \theta}$

Montrer que le lapin aura traversé la route avant le passage du camion si et seulement si $f(\theta) > 0$.

3) Conclure.

Rappel : La fonction $x \mapsto \tan x$ est dérivable sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right[$ et a pour dérivée la fonction $x \mapsto \frac{1}{\cos^2 x}$.

<http://www.apmep.asso.fr/IMG/pdf/CorrigeNlleCaledoSNov.2005.pdf>

NB: Comment masquer ou afficher les corrigés et les exercices en préparation

- Dans la version Open Office de ce document, les **corrigés** (s'ils existent) sont visibles sauf quand la variable CORR prend la valeur M (« M » pour « Masqué »). Une variable est un champ particulier (de type texte) et se crée de la même façon : « Insérer » puis « champs ». Attention ! Il faut placer la variable AVANT les sections qu'elle pilote.
- La variable CORR vaut en ce moment : CORR=M. Elle se pilote en haut du document.
- Pour créer une section masquée, sélectionner le texte à masquer, puis « insertion », puis «section » puis cliquer sur masquer : La condition s'écrit : CORR==« M » (Il faut les guillemets autour du M, un double égal et pas d'espaces).
- Pour faire réapparaître la section, changer la valeur de CORR à une autre valeur que M.
- Idem pour la variable EP (En Préparation) qui permet de masquer les exercices qui ne sont pas finis ou que j'envisage de mettre dans le DS. Elle vaut pour le moment EP=M et les sections correspondantes sont masquées quand EP=M. Elle se pilote en haut du document.
- Quand un exercice est prêt on peut supprimer la section correspondante (pour qu'il soit visible tout le temps) avec « Format » puis « Sections »
- Chers élèves, évidemment dans le pdf cela ne marche pas, c'est tout l'intérêt....